

# Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Circuncisión

## Actividad

Tan solo que el doctor le diga algo diferente, su hijo no tiene restricciones.

## Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

## Vendas

No hay vendas despues de las cirugía. Aplique la pomada antibiotica (bacitracin, Neosporin, Polysporin) sobre la incisión de el pene dos veces por día. Por la primera semana use la pomade anestésica (Neosporin-Plus, Polysporin-Plus o forma genérica). Si su hijo usa pañal, aplique la pomade con los cambiados de pañal por una semana. Si su hijo se pone ropa interior, le puede comprar en la farmacia Telfa (una venda adhesiva) para poner sobre la pomade para evitar que las puntadas se le peguen en la ropa interior.

## Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérica). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

## Baños

Su hijo se puede banar o ducharse 24 horas despues de la cirugía. Deje que el pene se le remoje bajo la agua por 5-10 minutos dos veces a el día, en la mañana y en la tarde. Una semana despues de la cirugía, el se puede bañar or ducharse por el tiempo que el quiera. Despues de una semana, el tambien puede nadar.

## Instrucciones Adicionales

Usted va notar hinchazon y moretones sobre el pene. Se va empeorar uno o dos días despues de la cirugía. Esto es normal y previsto. Es muy común ver hinchazón bajo la cabeza de el pene en la parte por debajo. Si nota un goteo de sangre constante o coágulos de sangre mas grandes que una haba, llame a el doctor.

Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Patient/Parent/Guardian	Nurse/Physician	Date
<b>David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P.</b> <b>Derek Matoka, M.D.</b> Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153	<b>Office:</b> <b>Appointments:</b> <b>Central Scheduling (all clinics)</b> Darien Elmhurst Hickory Hills Homer Glen Oakbrook Terrace Wheaton	708/216-6266  <b>708/216-8563</b> 630/985-4989 708/327-7030 708/233-5333 708.645.3400 630/953-6600 603.665.5995
<b>Anne Casaccio, RN</b> <b>Linda Bauman, Secretary</b> lbauman@luhs.org	708/216-5111 708/216-6266	Directions and maps available at <a href="http://www.luhs.org">www.luhs.org</a> 9/22/2010

# Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Circuncisión

## Actividad

Tan solo que el doctor le diga algo diferente, su hijo no tiene restricciones.

## Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

## Vendas

No hay vendas despues de las cirugía. Aplique la pomada antibiotica (bacitracin, Neosporin, Polysporin) sobre la incisión de el pene dos veces por día. Por la primera semana use la pomade anestésica (Neosporin-Plus, Polysporin-Plus o forma genérica). Si su hijo usa pañal, aplique la pomade con los cambiados de pañal por una semana. Si su hijo se pone ropa interior, le puede comprar en la farmacia Telfa (una venda adhesiva) para poner sobre la pomade para evitar que las puntadas se le peguen en la ropa interior.

## Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérica). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

## Baños

Su hijo se puede banar o ducharse 24 horas despues de la cirugía. Deje que el pene se le remoje bajo la agua por 5-10 minutos dos veces a el día, en la mañana y en la tarde. Una semana despues de la cirugía, el se puede bañar or ducharse por el tiempo que el quiera. Despues de una semana, el tambien puede nadar.

## Instrucciones Adicionales

Usted va notar hinchazon y moretones sobre el pene. Se va empeorar uno o dos días despues de la cirugía. Esto es normal y previsto. Es muy común ver hinchazón bajo la cabeza de el pene en la parte por debajo. Si nota un goteo de sangre constante o coágulos de sangre mas grandes que una haba, llame a el doctor.

Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Patient/Parent/Guardian	Nurse/Physician	Date
<b>David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P.</b> <b>Derek Matoka, M.D.</b> Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153	<b>Office:</b> <b>Appointments:</b> <b>Central Scheduling (all clinics)</b> Darien Elmhurst Hickory Hills Homer Glen Oakbrook Terrace Wheaton	708/216-6266  <b>708/216-8563</b> 630/985-4989 708/327-7030 708/233-5333 708.645.3400 630/953-6600 603.665.5995
<b>Anne Casaccio, RN</b> <b>Linda Bauman, Secretary</b> lbauman@luhs.org	708/216-5111 708/216-6266	Directions and maps available at <a href="http://www.luhs.org">www.luhs.org</a> 9/22/2010