

Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Cirugía Para la **Hidrocele**

Actividad

No debe participar en deportes organizados o en la clase de gimnasio en la escuela por dos semanas. Por lo de mas, su hijo no tiene restricciones.

Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

Vendas

No hay vendas despues de la cirugía. Hay una cinta adhesiva sobre la incisión que se pela dentro de 10-14 días despues de la cirugía.

Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérico). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

Baños

Su hijo se puede bañar o ducharse 48 horas despues de la cirugía. Por los primeros siete días, limite el baño a solo 5-10 minutos. Despues de la primera semana, el se puede bañar or ducharse por el tiempo que el quiera. Despues de una semana, el tambien puede nadar.

Instrucciones Adicionales

Usted va notar hinchazon y moretones sobre el escroto y la incisión abdominal.. Esto es normal y se desaparese dentro de dos o tres semanas. Si nota que el escroto se hincha mas que el tamaño de un limón, llame a el doctor. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

Patient/Parent/Guardian

David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P.
Derek Matoka, M.D.
Section of Pediatric Urology
Loyola University Medical Center
2160 S. First Avenue
Maywood, IL 60153

Anne Casaccio, RN 708/216-5111
Linda Bauman, Secretary 708/216-6266
lbauman@luhs.org

Nurse/Physician

Office: 708/216-6266
Appointments:
Central Scheduling (all clinics) 708/216-8563
Darien 630/985-4989
Elmhurst 708/327-7030
Hickory Hills 708/233-5333
Homer Glen 708.645.3400
Oakbrook Terrace 630/953-6600
Wheaton 603.665.5995

Date

Directions and maps available at www.luhs.org
9/22/2010

Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Cirugía Para la **Hidrocele**

Actividad

No debe participar en deportes organizados o en la clase de gimnasio en la escuela por dos semanas. Por lo de mas, su hijo no tiene restricciones.

Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

Vendas

No hay vendas despues de la cirugía. Hay una cinta adhesiva sobre la incisión que se pela dentro de 10-14 días despues de la cirugía.

Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérico). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

Baños

Su hijo se puede bañar o ducharse 48 horas despues de la cirugía. Por los primeros siete días, limite el baño a solo 5-10 minutos. Despues de la primera semana, el se puede bañar or ducharse por el tiempo que el quiera. Despues de una semana, el tambien puede nadar.

Instrucciones Adicionales

Usted va notar hinchazon y moretones sobre el escroto y la incisión abdominal.. Esto es normal y se desaparese dentro de dos o tres semanas. Si nota que el escroto se hincha mas que el tamaño de un limón, llame a el doctor. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

| Patient/Parent/Guardian | Nurse/Physician | Date |
|---|---|--------------|
| David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P. Derek Matoka, M.D. Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153 | Office: Appointments: Central Scheduling (all clinics) 708/216-8563 Darien 630/985-4989 Elmhurst 708/327-7030 Hickory Hills 708/233-5333 Homer Glen 708.645.3400 Oakbrook Terrace 630/953-6600 Wheaton 603.665.5995 | 708/216-6266 |
| Anne Casaccio, RN 708/216-5111 Linda Bauman, Secretary 708/216-6266 lbauman@luhs.org | Directions and maps available at www.luhs.org | 9/22/2010 |