



Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Cirugía Para la Hipospadias

Actividad

Su hijo no debe montar un caballo, triciclo, bicicleta o cualquier otro juguete por tres semanas despues de la operación. Tan solo que el doctor le diga algo diferente, su hijo no tiene otras restricciones.

Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

Vendas

Si es que su hijo tiene vendas, usted no va necesitar cambiar las. Su hijo va tener una cita para quitar la vendas en 2-3 días. De le un baño con esponja, pero no moje las vendas. Si su hijo usa pañal, la vendas se van a mojar cuando el haga de el baño. Esto esta bien. No mas limpie las vendas con una toalla mojada.

El día que se le van a quitar las vendas, remoje su hijo por 20-30 minutos antes de ir a la clinica. Esto va ablandar la vendas y permitir que se quiten. De le una dosis de medicina para el dolor antes de salir de la casa.

Ya que las vendas esten quitadas, usted va notar hinchazón y moretones. Tal vez va ver sangrado sobre la incisión en el pene. Esto es normal. Puede esperar que el hinchazón se va empeorar en los dos días que vienen. Tal vez va ver moretones en el pene asta el escroto. Si ve goteos de sangre de la incisión o coágulos de sangre mas grandes que una arveja, llame a el doctor. Ya que le quiten las vendas, aplique la pomada antibiotica (bacitracin, Neosporin, Polysporin) sobre las puntadas quatro veces por día o con los cambiados de pañal. Esto va evitar que las puntadas se le pegan en la ropa interior o pañal y tambien va prevenir infección. Tal vez su hijo va tener una sonda pequeña despues de la cirugía. Ponga pomade antibiotica en el lugar donde la sonda entra el canal urinario cada vez que le ponga la pomade en el pene.

Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. Use Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Cuando el dolor se mejore, puede usar Tylenol regular.

Baños

Si tiene vendas, su hijo debe tener baños con esponja hasta que le quiten las vendas. Despues de que le quiten las vendas, deje que su hijo se remoje en la aqua dos veces por día (en la mañana y en la tarde) por dos semanas. Pongale la pomade despues de los baños.

Instrucciones Adicionales

Esta cirugía causa mucho dolor. Su hijo va estar irritable y lloroso. Esto es normal. La medicina va ayudar con el dolor y permitir que el duerma, pero el no va estar cómodo por unos días. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

Patient/Parent/Guardian	Nurse/Physician	Date
David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P. Derek Matoka, M.D. Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153	Office: Appointments: Central Scheduling (all clinics) Darien Elmhurst Hickory Hills Homer Glen Oakbrook Terrace Wheaton	708/216-6266 708/216-8563 630/985-4989 708/327-7030 708/233-5333 708.645.3400 630/953-6600 603.665.5995
Anne Casaccio, RN Linda Bauman, Secretary lbauman@luhs.org	708/216-5111 708/216-6266	
	Directions and maps available at www.luhs.org	9/22/2010



Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Cirugia Para la Hipospadias

Actividad

Su hijo no debe montar un caballo, triciclo, bicicleta o cualquier otro juguete por tres semanas despues de la operacion. Tan solo que el doctor le diga algo diferente, su hijo no tiene otras restricciones.

Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugia. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugia. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

Vendas

Si es que su hijo tiene vendas, usted no va necesitar cambiar las. Su hijo va tener una cita para quitar la vendas en 2-3 días. De le un baño con esponja, pero no moje las vendas. Si su hijo usa pañal, la vendas se van a mojar cuando el haga de el baño. Esto esta bien. No mas limpie las vendas con una toalla mojada.

El día que se le van a quitar las vendas, remoje su hijo por 20-30 minutos antes de ir a la clinica. Esto va ablandar la vendas y permitir que se quiten. De le una dosis de medicina para el dolor antes de salir de la casa.

Ya que las vendas esten quitadas, usted va notar hinchazon y moretones. Tal vez va ver sangrado sobre la incision en el pene. Esto es normal. Puede esperar que el hinchazon se va empeorar en los dos días que vienen. Tal vez va ver moretones en el pene asta el escroto. Si ve goteos de sangre de la incision o coágulos de sangre mas grandes que una arveja, llame a el doctor. Ya que le quiten las vendas, aplique la pomada antibiotica (bacitracin, Neosporin, Polysporin) sobre las puntadas quatro veces por día o con los cambiados de pañal. Esto va evitar que las puntadas se le pegan en la ropa interior o pañal y tambien va prevenir infeccion. Tal vez su hijo va tener una sonda pequena despues de la cirugia. Ponga pomade antibiotica en el lugar donde la sonda entra el canal urinario cada vez que le ponga la pomade en el pene.

Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugia. Use Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Cuando el dolor se mejore, puede usar Tylenol regular.

Baños

Si tiene vendas, su hijo debe tener baños con esponja hasta que le quiten las vendas. Despues de que le quiten las vendas, deje que su hijo se remoje en la aqua dos veces por día (en la mañana y en la tarde) por dos semanas. Pongale la pomade despues de los baños.

Instrucciones Adicionales

Esta cirugia causa mucho dolor. Su hijo va estar irritable y lloroso. Esto es normal. La medicina va ayudar con el dolor y permitir que el duerma, pero el no va estar cómodo por unos días. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugia. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

Patient/Parent/Guardian	Nurse/Physician	Date
David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P. Derek Matoka, M.D. Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153	Office: Appointments: Central Scheduling (all clinics) Darien Elmhurst Hickory Hills Homer Glen Oakbrook Terrace Wheaton	708/216-6266 708/216-8563 630/985-4989 708/327-7030 708/233-5333 708.645.3400 630/953-6600 603.665.5995
Anne Casaccio, RN Linda Bauman, Secretary lbauman@luhs.org	708/216-5111 708/216-6266	Directions and maps available at www.luhs.org 9/22/2010