

Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Meatotomia

Actividad

Tan solo que el doctor le diga algo diferente, su hijo no tiene restricciones.

Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

Vendas

Generalment, no hay vendas despues de la cirugía. Aplique la pomada antibiotica (que le dieron en la clinica) dentro de el canal urinario o uretra dos veces por día por dos semanas.

Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérica). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

Baños

Su hijo se puede bañar o ducharse 24 horas despues de la cirugía. Ne le talle el pene. Simplemente, deje que la agua le corra por la área.

Instrucciones Adicionales

Tal vez, usted va notar sangre en la punta de el pene por 2-3 días. Esto es normal. Si nota un goteo de sangre constante, llame a el doctor. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

Patient/Parent/Guardian	Nurse/Physician	Date
David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P. Derek Matoka, M.D. Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153	Office: Appointments: Central Scheduling (all clinics) Darien Elmhurst Hickory Hills Homer Glen Oakbrook Terrace Wheaton	708/216-6266 708/216-8563 630/985-4989 708/327-7030 708/233-5333 708.645.3400 630/953-6600 603.665.5995
Anne Casaccio, RN Linda Bauman, Secretary lbauman@luhs.org	708/216-5111 708/216-6266	Directions and maps available at www.luhs.org 9/22/2010

Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Meatotomia

Actividad

Tan solo que el doctor le diga algo diferente, su hijo no tiene restricciones.

Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

Vendas

Generalment, no hay vendas despues de la cirugía. Aplique la pomada antibiotica (que le dieron en la clinica) dentro de el canal urinario o uretra dos veces por día por dos semanas.

Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérica). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

Baños

Su hijo se puede bañar o ducharse 24 horas despues de la cirugía. Ne le talle el pene. Simplemente, deje que la agua le corra por la área.

Instrucciones Adicionales

Tal vez, usted va notar sangre en la punta de el pene por 2-3 días. Esto es normal. Si nota un goteo de sangre constante, llame a el doctor. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

Patient/Parent/Guardian	Nurse/Physician	Date
David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P. Derek Matoka, M.D. Section of Pediatric Urology Loyola University Medical Center 2160 S. First Avenue Maywood, IL 60153	Office: Appointments: Central Scheduling (all clinics) Darien Elmhurst Hickory Hills Homer Glen Oakbrook Terrace Wheaton	708/216-6266 708/216-8563 630/985-4989 708/327-7030 708/233-5333 708.645.3400 630/953-6600 603.665.5995
Anne Casaccio, RN Linda Bauman, Secretary lbauman@luhs.org	708/216-5111 708/216-6266	Directions and maps available at www.luhs.org 9/22/2010