

# Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Cirugía Para el Criptorquidea

## Actividad

Su hijo no debe montar un triciclo, una bicicleta o cualquier otro juguete por tres semanas despues de la operación. No debe participar en deportes organizados o en la clase de gimnasio en la escuela por tres semanas. Por lo de mas, su hijo no tiene restricciones. No lo tiene que mantener tranquilo. Cuando el se sienta mejor, el va querer caminar, correr, y jugar. Esto esta bien mientras no se monte en algun juguete o bicicleta.

## Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugía. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugía. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

## Vendas

No hay vendas despues de las cirugía. Hay una cinta adhesiva sobre la incisión que se pela dentro de 10-14 días despues de la cirugía. Cuando la cinta adhesiva ya este pelandose parcialmente, usted la puede pelar por completo. Aplique la pomada antibiotica (bacitracin, Neosporin, Polysporin) sobre la incisión en el escroto cuatro veces por día o con los cambios de paal por una semana. Si su hijo se pone ropa interior, le puede comprar en la farmacia Telfa (una venda adhesive) para poner sobre la pomade para evitar que las puntadas se le pegan en la ropa interior.

## Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugía. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofén (Motrin para niños, Advil para niños, o forma genérico). Si la ibuprofén no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeína segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeína pero no las dos.

## Baños

Su hijo se puede bañar o ducharse 48 horas despues de la cirugía. Por los primeros siete días, limite el baño a solo 5-10 minutos. Despues de la primera semana, el se puede bañar or ducharse por el tiempo que el quiera. Despues de una semana, el tambien puede nadar.

## Instrucciones Adicionales

Usted va notar hinchazon y moretones sobre el escroto y la incisión abdominal. Usted tambien va notar manchadas de sangre. Esto es normal. Si nota un goteo de sangre constante, llame a el doctor. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugía. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

---

Patient/Parent/Guardian

**David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P.**  
**Derek Matoka, M.D.**  
Section of Pediatric Urology  
Loyola University Medical Center  
2160 S. First Avenue  
Maywood, IL 60153

**Anne Casaccio, RN** 708/216-5111  
**Linda Bauman, Secretary** 708/216-6266  
lbauman@luhs.org

---

Nurse/Physician

**Office:** 708/216-6266

**Appointments:**

<b>Central Scheduling (all clinics)</b>	<b>708/216-8563</b>
Darien	630/985-4989
Elmhurst	708/327-7030
Hickory Hills	708/233-5333
Homer Glen	708.645.3400
Oakbrook Terrace	630/953-6600
Wheaton	603.665.5995

Directions and maps available at [www.luhs.org](http://www.luhs.org)  
9/22/2010

# Instrucciones Para Los Padres Sobre el Cuidado Despues de la Cirugia Para el Criptorquidea

## Actividad

Su hijo no debe montar un triciclo, una bicicleta o cualquier otro juguete por tres semanas despues de la operacion. No debe participar en deportes organizados o en la clase de gimnasio en la escuela por tres semanas. Por lo de mas, su hijo no tiene restricciones. No lo tiene que mantener tranquilo. Cuando el se sienta mejor, el va querer caminar, correr, y jugar. Esto esta bien mientras no se monte en algun juguete o bicicleta.

## Dieta

Su hijo puede comer lo que el quiera. A veces los niños que estuvieron bajo anestesia van a vomitar dentro de las primeras seis horas despues de la cirugia. Esto es comun y no se debe alarmar. Algunos niños tienen mucha sed o hambre despues de la cirugia. Es mejor empezar despacio con traguitos de agua o jugo. Despues que su hijo pueda tolerar liquidos, puede empezar con comidas solidas.

## Vendas

No hay vendas despues de las cirugia. Hay una cinta adhesiva sobre la incision que se pela dentro de 10-14 días despues de la cirugia. Cuando la cinta adhesiva ya este pelandose parcialmente, usted la puede pelar por completo. Aplique la pomada antibiotica (bacitracin, Neosporin, Polysporin) sobre la incision en el escroto cuatro veces por día o con los cambios de paal por una semana. Si su hijo se pone ropa interior, le puede comprar en la farmacia Telfa (una venda adhesive) para poner sobre la pomade para evitar que las puntadas se le pegan en la ropa interior.

## Medicaciones

Su hijo va necesitar medicaciones para el dolor despues de la cirugia. A menos que le ordenen algo diferente, usted puede usar ibuprofen (Motrin para ninos, Advil para ninos, o forma genérico). Si la ibuprofen no le alivia el dolor, usted puede usar Tylenol con codeina segun las instrucciones en la botella. Puede usar Tylenol regular o Tylenol con codeina pero no las dos.

## Baños

Su hijo se puede bañar o ducharse 48 horas despues de la cirugia. Por los primeros siete días, limite el baño a solo 5-10 minutos. Despues de la primera semana, el se puede bañar or ducharse por el tiempo que el quiera. Despues de una semana, el tambien puede nadar.

## Instrucciones Adicionales

Usted va notar hinchazon y moretones sobre el escroto y la incision abdominal. Usted tambien va notar manchadas de sangre. Esto es normal. Si nota un goteo de sangre constante, llame a el doctor. Su hijo puede tener una fiebre baja la noche despues de la cirugia. Llame a el doctor si la fiebre es mas de 102 grados Fahrenheit.

Su su hijo tiene dificultad en respirar, pérdida de sangre que usted piense excesivo, nauseas o vómitos, dolor raro, hinchado, o fiebre, llame a su cirujano a 708/216-6266 (Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 5:00 p.m.) o 708/216-8000 (tardes, noches o fines de semana). En caso de emergencia, lleve su hijo a la sala de emergencia de Loyola (708/216-3882) o a una sala de emergencia cerca a usted.

Patient/Parent/Guardian

**David A. Hatch, M.D., F.A.C.S., F.A.A.P.**  
**Derek Matoka, M.D.**  
Section of Pediatric Urology  
Loyola University Medical Center  
2160 S. First Avenue  
Maywood, IL 60153

**Anne Casaccio, RN** 708/216-5111  
**Linda Bauman, Secretary** 708/216-6266  
lbauman@luhs.org

Nurse/Physician

**Office:** 708/216-6266  
**Appointments:**  
**Central Scheduling (all clinics)** **708/216-8563**  
Darien 630/985-4989  
Elmhurst 708/327-7030  
Hickory Hills 708/233-5333  
Homer Glen 708.645.3400  
Oakbrook Terrace 630/953-6600  
Wheaton 603.665.5995

Directions and maps available at [www.luhs.org](http://www.luhs.org)  
9/22/2010

Date